# Esclarecendo as dúvidas sobre a vacinação contra gripe e Covid-19

**Date :** 15-04-2021

**Qual das duas vacinas devo tomar primeiro, contra a Covid ou gripe?** O Ministério da Saúde recomenda dar prioridade à vacina contra a Covid-19. Se você faz parte de um dos grupos prioritários que estão incluídos nas duas campanhas, como idoso ou profissional de saúde, e tem perspectiva para se vacinar, aguarde para se vacinar contra a gripe após a vacinação contra Covid.

**Tomei a vacina CoronaVac contra a Covid-19, quando posso tomar a**

**vacina da gripe?** O intervalo entre as duas doses dessa vacina é de 28 dias. Por isso, é recomendado que sejam aplicadas as duas doses da CoronaVac para completar o esquema vacinal, respeitar um intervalo mínimo de 14 dias após a 2ª dose, e só então se vacinar contra a gripe.

**E para quem tomou a vacina de Oxford/Fiocruz, quando pode tomar a vacina da gripe?** Como o intervalo entre as doses dessa vacina é maior (90 dias), a pessoa pode se vacinar contra a gripe 14 dias antes ou 14 dias depois da 1ª ou 2ª dose.

**Posso tomar as duas juntas?** Não. O Ministério da Saúde recomenda o intervalo de 14 dias entre uma vacina e outra, pois ainda não há estudos que garantam a segurança e interferência da eficácia das vacinas em situações como essa.

**Por que a vacinação não começou pelos idosos?** Anualmente, é comum que a companha seja iniciada pelo grupo do idosos, mas, neste ano, por conta da vacinação da Covid-19 eles foram transferidos para a segunda etapa, a fim de evitar a confusão entre os calendários das duas vacinações.

**Estou com sintomas de síndrome gripal, posso tomar a vacina?** É recomendado o adiamento da vacinação contra a influenza nas pessoas com quadro sugestivo de infecção pela Covid-19 em atividade, para se

evitar confusão com outros diagnósticos diferenciais.

**Se me vacinei contra a Covid, por que preciso me vacinar também contra a gripe?** A vacina da Covid-19 não protege contra a gripe ou vice-versa. A vacinação contra a influenza ajuda a prevenir o surgimento de complicações decorrentes dessa doença, óbitos e reduzir o impacto sobre os serviços de saúde, além de minimizar a carga da doença, reduzindo os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19.

Se você pertence aos grupos prioritários das duas campanhas deve tomar as duas vacinas.