Hipertensos e diabéticos de 40 ou mais anos poderão se vacinar neste sábado

Date : 07-05-2021



Neste sábado (8), a vacinação segue em todos os pontos espalhados pelo município, das 9h às 13h, desta vez, incluindo também pessoas de 40 a 59 anos com hipertensão e diabetes mellitus, trabalhadores da Educação de 40 a 59 anos, pessoas de 18 a 59 anos com transplante, síndrome de Down ou imunossupressão e idosos de 60 anos ou mais.

1ª DOSE → OXFORD

Pessoas com diabetes mellitus ou hipertensão - 40 anos ou mais

Sábado (08/05) - 9h às 13h
Enquanto houver estoque disponível

Locais de vacinação

Drive-thru
Universidade Federal da Bahia (Ufba) - Candeias

Pontos fixos para pedestres
Quadra da Igreja Nova Sião - Alto Maron
Escola Municipal Professora Fidelcina Carvalho Santos - Urbis VI
Colégio Paulo VI - Ibirapuera
Paróquia Rainha da Paz - Patagônia
Salão Paroquial da Santa Luzia - Urbis V
Quadra esportiva da Fainor – Candeias

Documento pessoal com CPF
Relatório Médico, Receita Médica ou Cadastro de acompanhamento da Unidade de Saúde de referência

VACINA CONQUISTA
JUNTOS VAMOS VENCER A COVID-19

PREFEITURA VITÓRIA DA CONQUISTA
GOVERNO PARA PESSOAS



A vacinação vai ocorrer nos seguintes pontos fixos para pedestres da quadra da Igreja Nova Sião, Escola Municipal Professora Fidelcina Carvalho Santos, Colégio Paulo VI, Paróquia Rainha da Paz, Salão Paroquial da Santa Luzia e quadra esportiva da Fainor e no drive-thru na Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Para comprovação, os portadores de hipertensão e diabetes devem apresentar relatório médico, receita médica ou cadastro de acompanhamento da Unidade de Saúde de referência. Já os trabalhadores da Educação devem apresentar o contracheque de abril de 2021. As

pessoas transplantadas, com síndrome de Down e imunossupressão, com idade entre 18 e 59 anos, devem levar o relatório médico e/ou receita médica. Todos os públicos incluídos na vacinação devem apresentar o documento pessoal com CPF.



1ª DOSE → OXFORD

Idosos 60 anos ou mais

Sábado (08/05) - 9h às 13h
Enquanto houver estoque disponível

Locais de vacinação

Drive-thru
Universidade Federal da Bahia (Ufba) - Candeias

Pontos fixos para pedestres
Quadra da Igreja Nova Sião - Alto Maron
Escola Municipal Professora Fidelcina Carvalho Santos - Urbis VI
Colégio Paulo VI - Ibirapuera
Paróquia Rainha da Paz - Patagônia
Salão Paroquial da Santa Luzia - Urbis V
Quadra esportiva da Fainor - Candeias

Atenção!

É permitido apenas um acompanhante por idoso.
Não se esqueça de levar documento de identificação com CPF.

VACINA CONQUISTA
JUNTOS VAMOS VENCER A COVID-19

PREFEITURA VITÓRIA DA CONQUISTA
GOVERNO PARA PESSOAS



A aplicação da 2ª dose da vacina Oxford/Fiocruz vai estar disponível apenas nos pontos fixos de pedestres, onde estarão vacinando com a primeira dose. Serão vacinadas as pessoas que estiverem com data de retorno marcado no cartão de vacina para o dia 8 de maio.

Hipertensão - De acordo a Resolução nº 77 da Comissão Intergestores Bipartite da Bahia (CIB), são consideradas hipertensas pessoas com hipertensão arterial resistente (HAR) - quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de 3 ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas,

administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de 4 ou mais fármacos antihipertensivos; hipertensão arterial estágio 3 - PA sistólica >=180mmHg e/ou diastólica >= 110mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade; hipertensão arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade - PA sistólica entre 140 e 179 mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade.

Doenças crônicas – Na imunização de pessoas com doenças crônicas e condições clínicas especiais, de 18 a 59 anos, estão incluídos apenas indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente maior de 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses, e neoplasias hematológicas.