



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
www.pmvc.ba.gov.br

ALERTA nº 01 Sarampo: Risco de Surto de Sarampo no Estado e no Município

Com a retomada do convívio escolar e a redução do rigor do distanciamento social instituído durante a pandemia de Covid-19, aliado às baixas coberturas vacinais de rotina, o risco para a dispersão do vírus do sarampo, no país, encontra-se elevado.

Até o momento a Bahia não apresenta circulação endêmica do vírus do sarampo. Até a semana epidemiológica nº 16 foram notificados 35 casos suspeitos de Doenças Exantemáticas, destes 08 casos de sarampo e 05 de rubéola ainda estão em investigação e os demais foram descartados. Em Vitória da Conquista, até a semana epidemiológica nº 16 foram notificados 11 casos suspeitos de Sarampo, dos quais 09 foram descartados e 02 casos ainda estão em investigação laboratorial. No Estado de São Paulo foram confirmados 02 casos de Sarampo em abril de 2022. Os casos são autóctones, ou seja, as pessoas contraíram o vírus no próprio território brasileiro acendendo ainda mais o alerta do risco de entrada do vírus no estado da Bahia e em Vitória da Conquista.

Assim, tendo em vista o cenário apresentado a Diretoria de Vigilância em Saúde e a Coordenação de Vigilância Epidemiológica Municipal vem através deste reforçar a recomendação para os profissionais de saúde: **TOTAL ALERTA a QUALQUER caso suspeito de doença exantemática febril.**

Definição de caso suspeito de sarampo:

"Todo paciente que, independente da idade e da situação vacinal, apresentar febre e exantema maculopapular, acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite; ou todo indivíduo suspeito com história de viagem ao exterior nos últimos 30 dias ou de contato, no mesmo período, com alguém que viajou ao exterior."

O sarampo é altamente transmissível, pode ter apresentação grave e cursar com complicações sérias, como pneumonia e encefalite e pode potencialmente ter evolução fatal. Após exposição a um caso de sarampo praticamente todos os indivíduos suscetíveis adquirem a doença. O vírus pode ser transmitido seis dias antes do exantema e dura até quatro dias após seu aparecimento.

A vacina tríplice viral é a medida de prevenção mais segura e eficaz contra o sarampo, protegendo também contra a rubéola e a caxumba.

Recomenda-se fortemente aos profissionais que na detecção de qualquer caso suspeito:

- proceder a notificação imediata, em até 24h, à vigilância epidemiológica (77 3429-7405/ 77 3429-7403/ 773429-7411);



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
www.pmvc.ba.gov.br

- encaminhar para coleta de espécimes clínicos (sorologia, isolamento viral: secreção nasofaríngea e isolamento viral: urina) entre o 5º e 7º dia do início do exantema para a realização do diagnóstico laboratorial, encaminhando o paciente ao Laboratório Central do Município (LACEN) de 9:00 a 11:00h nas quartas-feiras ou quintas-feiras, com cópia da notificação contendo o número do SINAN e as três guias de solicitações de exames.
- adotar as medidas de controle (bloqueio vacinal seletivo com vacina tríplice viral ou tetraviral (vide páginas 229 a 231 do Guia de Vigilância em Saúde, 5ª Ed., 2021) frente aos casos suspeitos e sua ampliação na presença de sorologia reagente);
- todo caso suspeito que ainda tiver dose pendente para receber vacina tríplice viral ou tetraviral só deverá ser vacinado após o encerramento do caso.
- orientar isolamento social do caso suspeito.
- Oportunizar o levantamento de dados dos contatos diretos e indiretos para monitoramento semanal e verificação do possível aparecimento de sintomas (por até 30 dias do contato);
- busca ativa na unidade de saúde e na área geográfica a fim de detectar outros possíveis casos. Monitorar evolução clínica do caso suspeito.
- Em todas as crianças com suspeita de sarampo recomenda-se a administração do palmitato de retinol (vitamina A), mediante avaliação clínica e/ou nutricional por um profissional de saúde, para redução da mortalidade e prevenção de complicações pela doença, nas dosagens indicadas no Quadro abaixo.

QUADRO 2 – Indicação do uso de vitamina A para crianças consideradas como casos suspeitos de sarampo, segundo faixa etária

FAIXA ETÁRIA	TRATAMENTO (PALMITATO DE RETINOL)	VIA DE ADMINISTRAÇÃO	POSOLOGIA
Crianças menores de 6 meses de idade	50.000 UI	Oral	Duas doses (uma dose no dia da suspeita e uma no dia seguinte)
Crianças entre 6 e 11 meses e 29 dias de idade	100.000 UI	Oral	Duas doses (uma dose no dia da suspeita e uma no dia seguinte)
Crianças maiores de 12 meses de idade	200.000 UI	Oral	Duas doses (uma dose no dia da suspeita e uma no dia seguinte)

Fonte: Traduzido de PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 2005.

Em anexo, encaminhamos fluxograma de Vigilância das Doenças Exantemáticas. Para mais informações consultem o Guia de Vigilância em Saúde, 5ª Ed., 2021, pg. 216-231 e nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Ana Maria Ferraz
Diretora de Vigilância em Saúde

Enfª Dáine Pereira




MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
www.pmvc.ba.gov.br

Referência Técnica das Doenças Exantemáticas

FLUXOGRAMA DE VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS EXANTEMÁTICAS



1-Caso suspeito de sarampo: Todo paciente que apresentar febre e exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalo-caudal, acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite, independentemente da idade e situação vacinal; ou Todo indivíduo suspeito com história de viagem para locais com circulação do vírus do sarampo, nos últimos 30 dias, ou de contato, no mesmo período, com alguém que viajou para local com circulação viral.

1-Caso suspeito de Rubéola Todo paciente que apresentar febre e exantema maculopapular, acompanhado de linfadenopatia retroauricular e/ou occipital e/ou cervical, independentemente da idade e da situação vacinal; ou Todo indivíduo suspeito com história de viagem para locais com circulação do vírus da rubéola, nos últimos 30 dias, ou de contato, no mesmo período, com alguém que viajou para local com circulação viral.

2-Bloqueio Vacinal: Seletivo, ou seja, conforme a situação vacinal, com vacina tríplice viral ou tetraviral (vide páginas 229 a 231 do Guia de Vigilância em Saúde, 5ª Ed., 2021).

3- Encaminhamento e coleta de exames: De 5º ao 7º dia do início do Exantema - Solicitar em três (3) saídas para Vitória da Conquista - Bahia: **Suspeito de Sarampo:** sorologia para Sarampo IgG e IgM, Isolamento viral: swab (1ª da manhã ou retida por no mínimo 2h), Isolamento viral: swab de secreção de naso e orofaringe. **Suspeita de Rubéola:** sorologia para Rubéola IgG e IgM, Isolamento viral: urina (1ª da manhã ou retida por no mínimo 2h); Isolamento viral: swab de

Rua Rotary Club, nº69, Centro

Fone: (77) 3429-7403/7405 (Vig. Epidemiológica); 3429-7407 (Fax)

E-mail: conquista@pmvc.ba.gov.br

www.conquista.ba.gov.br

www.conquista.ba.gov.br

www.conquista.ba.gov.br