



MÉDICO GASTROENTEROLOGIA - 20H

PORTUGUÊS

O AMOR E A LOUCURA

No Amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, sua chama e sua infância eterna.

Mas por que o amor é cego?

Aconteceu que num certo dia o Amor e a Loucura brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu então o Amor que se reunisse para tratar do assunto o conselho dos deuses. Mas a Loucura, impaciente, deu-lhe uma pancada tão violenta que lhe privou da visão.

Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, aos gritos. E diante de Júpiter, Nêmesis – a deusa da vingança – e de todos os juizes do inferno, Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego.

Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do Supremo Tribunal Celeste consistiu em condenar a Loucura a servir de guia ao Amor.

(In: Flávio Moreira da Costa, org. Os melhores contos de loucura. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. P. 17-8)

QUESTÃO 01

Após a leitura do texto de La Fontaine, considere as seguintes afirmações:

- I. As palavras Loucura e Amor são personagens da história, por isso são grafadas com iniciais maiúsculas, como todo nome próprio;
- II. A estrutura do texto pertence ao gênero textual fábula e, portanto, poderia apresentar o seguinte ensinamento: “o amor, além de cego, é guiado pela loucura.”;
- III. Amor e loucura são adjetivos abstratos;
- IV. No trecho “Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado.” Há um período composto por subordinação.

Estão corretas:

- A. Apenas I e III.
- B. Apenas I, II e III.
- C. Apenas I.
- D. Apenas I, II e IV.
- E. Todas as afirmações.

QUESTÃO 02

O sinal indicativo de crase está empregado corretamente na frase:

- A. As origens da poesia amorosa italiana geram controvérsias; as opiniões diferem conforme se dá mais relevo à novidade do conteúdo ou à novidade da forma artística.
- B. No século XVI, a literatura italiana antecipou-se à todas as outras literaturas europeias, criando novos gêneros e formas de expressão.
- C. Com os mestres de Dante, começa a poesia amorosa; Dante e Petrarca à continuam e Boccaccio fornece a ela novo requinte psicológico.
- D. Com a enorme influência da literatura francesa medieval não pode ser comparada à da literatura italiana do século XVI.
- E. As famílias florentinas dos Bardi e Peruzzi, comerciantes de lã, chegaram à conceder vultosos empréstimos à outras nações.

QUESTÃO 03

A narrativa medieval descreve essa “doença do pensamento, do espírito” como um modo de obsessão que o homem e a mulher, fazendo com que presos no desejo de estar um com o outro e atormentados quando não podem se encontrar.

A estrutura ideal o amor impossível.

(Adaptado de: Luiz Felipe Pondé. **Folha de S. Paulo**, 11/02/2013)

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada:

- A. arrastaria - ficassem - suponha
- B. arrastava - ficam - supôs
- C. arraste - ficassem - suponha
- D. arrastaria - ficariam - supunha
- E. arrasta - fiquem – supõe

QUESTÃO 04

Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está corretamente acentuada, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da língua portuguesa:

- A. Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, Balaústre.
- B. Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, Pestífero, Rotulo, Elétrico.



MÉDICO GASTROENTEROLOGIA - 20H

- C. Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, Egoísta.
- D. Heróico, Vestuário, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, Número.
- E. Indivíduo, Média, Pestífero, Elétrico, Egoísta, Hidrelétrica, Número.

QUESTÃO 05

Quais das frases abaixo estão corretas quanto à concordância verbal:

- I. Mais de um professor participou das assembleias.
- II. Mais de um professor participaram das assembleias.
- III. Ia dar oito horas quando Maria chegou do trabalho.
- IV. Ana, José e Francisca festejou o São João na roça.
- V. Procura-se costureiras experientes.

- A. I, III e V
- B. I e V
- C. I e IV
- D. II e V
- E. III, IV e V

LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÃO 06

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único que visa:

- A. Atendimento voltado para atividades preventivas.
- B. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- C. Atendimento voltado apenas para as atividades assistenciais.
- D. Apenas ações de promoção da saúde.
- E. Apenas ações de prevenção secundária.

QUESTÃO 07

Quanto aos aspectos globais de assistência à saúde, a prevenção secundária consiste, principalmente em:

- A. Estabelecer medidas destinadas a promover uma saúde geral ideal.
- B. Diagnosticar e tratar precocemente as doenças.
- C. Promover saneamento ambiental e proteção contra acidentes.
- D. Promover imunização e prevenir riscos ocupacionais.
- E. Reintegrar o indivíduo à sociedade.

QUESTÃO 08

Nas alternativas abaixo coloque V para verdadeiras e F para falsas:

- () As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do SUS.
- () Quando as disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial a população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- () Os serviços públicos que integram o SUS constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.

A sequência está correta em:

- A. F, F, F
- B. V, V, V
- C. F, V, V
- D. F, V, F
- E. V, V, F

QUESTÃO 09

Considerando o disposto no artigo 196 da Constituição Federal e Lei Federal 8080/1990 que dispõem sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde, indique abaixo a alternativa que se apresenta incorreta:

- A. Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde.
- B. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.
- C. Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça de forma adequada.



MÉDICO GASTROENTEROLOGIA - 20H

- D. Todo cidadão tem direito ao atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos.
- E. Todo cidadão tem direito a tratamento individualizado em clínicas especializadas escolhidas a seu critério.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa incorreta quanto às diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS:

- A. Descentralização e controle social.
- B. Hierarquização e regionalização.
- C. Centralização na assistência médica.
- D. Participação complementar do setor privado.
- E. Universalidade e equidade.

ESPECÍFICAS

QUESTÃO 11

Mecanismos de tratamento medicamentoso da Doença de Crohn tem como objetivos, exceto:

- A. Suprimir a atividade da doença, aliviando os sintomas gastrointestinais e extraintestinais.
- B. Corrigir deficiências nutricionais e garantir aporte calórico adequado para o crescimento linear e ganho de peso.
- C. Prevenir suas complicações.
- D. Suprir a deficiência de lactose.
- E. Minimizar o impacto da doença sobre o paciente e seus familiares.

QUESTÃO 12

Admite-se que até 45% das hemorragias digestivas altas são causadas por úlceras pépticas. Considerando as afirmativas sobre os fatores preditivos de tratamento operatório nos doentes admitidos com úlceras pépticas hemorrágicas, analise as assertivas abaixo, indique V (verdadeiro) e F (falso) e, em seguida, marque a alternativa CORRETA:

- () sangramento em jato proveniente da lesão.
- () sangramento difuso proveniente da lesão.
- () presença de coto vascular.
- () presença de coágulo aderente ao fundo da úlcera.

A sequência correta é:

- A. V – V – V – V.
- B. V – F – V – V.
- C. F – F – V – V.
- D. F – V – V – F.
- E. V – V – V – F.

QUESTÃO 13

Na doença do refluxo gastroesofágico, a lesão anatomopatológica com metaplasia do epitélio escamoso para um epitélio colunar é um fator de risco para o desenvolvimento de:

- A. Epitélio de Barrett e adenocarcinoma.
- B. Úlcera gástrica, gastrite – câncer gástrico.
- C. Infiltração eosinofílica e esofagite eosinofílica.
- D. Síndrome de Zollinger Ellison e Gastrinoma.
- E. Síndrome de Mallory Weiss e hemorragia digestiva.

QUESTÃO 14

Entre as causas de hipertensão portal por aumento do fluxo na veia porta se inclui:

- A. Cirrose.
- B. Doença de Wilson.
- C. Hemocromatose.
- D. Fibrose hepática congênita.
- E. Fístula arterio-portal.

QUESTÃO 15

Sobre o tratamento da pancreatite afirma-se:

- I. A base do tratamento é o suporte clínico e a suspensão da ingesta oral, já que ainda não há tratamento específico para a pancreatite. Este suporte clínico consiste em manutenção da perfusão tecidual através de reposição volêmica vigorosa e manutenção da saturação de oxigenação, analgesia e suporte nutricional.
- II. Pacientes com pancreatite aguda geralmente apresentam hipovolemia importante secundária ao sequestro de líquido, necessitando de hidratação volêmica agressiva para melhorar a perfusão tecidual pancreática e tentar evitar o desenvolvimento de necrose pancreática e prevenir a evolução para formas graves. Como não há como antecipar as necessidades de reposição volêmica, os pacientes devem ser monitorados continuamente para avaliar a efetividade do tratamento. Os critérios utilizados são o

MÉDICO GASTROENTEROLOGIA - 20H

hematócrito, débito urinário, frequência cardíaca, azotemia e turgor cutâneo. No caso de pacientes com comorbidades como insuficiência renal ou cardiopatias, pode ser necessária a utilização de monitorização invasiva.

- III. A analgesia também é essencial, sendo classicamente utilizados opioides parenterais, como a morfina e a meperidina, sendo ainda controversa qual a melhor opção de droga.

Está (ão) CORRETA (s):

- A. Apenas I.
- B. I e II.
- C. I e III.
- D. II e III.
- E. I, II e III.

QUESTÃO 16

Sobre a doença ulcerosa péptica está INCORRETO afirmar:

- A. A infecção do antro gástrico pelo *H. pylori* (HP) induz uma hipersecreção ácida através da inibição das células produtoras de somatostatina e consequente aumento da liberação de gastrina pelas células G do antro gástrico.
- B. Como consequência da maior oferta de ácido ao duodeno, haverá o desenvolvimento (ou ampliação se preexistentes) de áreas de metaplasia gástrica no duodeno, as quais, então, poderão ser colonizadas pelo HP levando à duodenite e, eventualmente, úlcera duodenal.
- C. Fatores genéticos e ambientais, além daqueles relacionados à virulência do microrganismo, poderão afetar a fisiologia gástrica e o desfecho da doença.
- D. As úlceras gástricas tendem a ocorrer em mucosa secretora de ácido ou próximas à junção com a mucosa secretora. Mesmo quando ocorrem na região alta da pequena curvatura, elas incidem em mucosa secretora.
- E. A pangastrite induzida pelo HP é a responsável pelas alterações metaplásicas que transformam a mucosa secretora em não secretora.

QUESTÃO 17

A respeito das doenças hepáticas, assinale a alternativa INCORRETA.

- A. Os abscessos hepáticos piogênicos são causados em sua maioria por *E. coli*, *Klebsiellae* *Streptococcus*, e seu tratamento é realizado com antibioticoterapia e drenagem por meio de punções, sendo a cirurgia reservada para casos que não respondem a essas medidas.
- B. Os adenomas hepáticos são tumores que incidem preferencialmente em mulheres, muito relacionados ao uso de anticoncepcionais orais que frequentemente regredem após a sua descontinuidade.
- C. A síndrome de Budd-Chiari tem origem na obstrução (trombose) das veias hepáticas ou do segmento distal da veia porta e levam ao desenvolvimento de ascite, cirrose hepática e hipertensão portal.
- D. A hepatite alcoólica pode ser diagnosticada quando há febre, anorexia, hepatomegalia dolorosa e icterícia após grande ingestão etílica, associada a alterações laboratoriais, como aumento da gama GT, hiperbilirrubinemia e leucocitose, e relação AST/ALT classicamente menor que 1.
- E. A doença de Wilson é causada pelo acúmulo tóxico de cobre nos tecidos (ocasionando lesão hepática e neurológica), cursa com baixos níveis de ceruloplasmina e seu tratamento visa à remoção do excesso do cobre orgânico com a D-penicilamina.

QUESTÃO 18

Sobre a icterícia, assinale a alternativa INCORRETA.

- A. As icterícias não colestáticas são caracterizadas pela hiperbilirrubinemia indireta e tem como exemplos as síndromes de GilberteCrigler – Najjar.
- B. A colestase é causada por déficit na excreção da bile que pode ocorrer desde o hepatócito até a ampola de Vater e pode ser intra ou extrahepática.
- C. A hemólise cursa com elevação da bilirrubina direta e é uma importante causa de icterícia na infância.
- D. A CPER pode ser empregada para tratamento nos casos de icterícia obstrutiva por coledocolitíase e em alguns casos de neoplasia periampular.



MÉDICO GASTROENTEROLOGIA - 20H

- E. Na investigação da icterícia obstrutiva, os exames de imagem (ultrassonografia, tomografia, dentre outros) são de grande auxílio diagnóstico.

QUESTÃO 19

O melhor tratamento para pacientes infectados com hepatite C, genótipo 1, é:

- A. Telaprevir e PEG interferon.
- B. Ribavirina e PEG interferon.
- C. lamivudina, ribavirina e PEG interferon.
- D. Boceprevir ,ribavirina e PEG interferon.
- E. Boceprevir, telaprevir e PEG inteferon.

QUESTÃO 20

Os cistos biliares são dilatações congênitas das vias biliares intra e/ou extra hepáticas. Sua importância maior está associada ao desenvolvimento de icterícia obstrutiva, episódios de colangite e risco aumentado de desenvolvimento de colangiocarcinoma. A doença de Caroli corresponde a qual cisto biliar na classificação de Todani?

- A. I
- B. II
- C. III
- D. IV
- E. V